


# **Disfagias**

# Disfagias

**Orales**

**Faringo  
esofágicas**

**Disfagias  
faringo - esofágicas**



**Disfagia cricofaríngea**

# **Disfagia cricofaríngea**

**Enfermedad CONGÉNITA o adquirida,**

**Hay una incoordinación del EES,**

**con la relajación de la faringe,**

**puede haber**

**alteración de motilidad de esófago superior**

## **Disfagia cricofaríngea**

### **Signos clínicos**

**Movimientos deglutorios  
repetidos, salida  
de líquido por nariz,  
falta de ganancia de peso,  
regurgitación, neumonía**

**Disfagia cricofaríngea**

**Diagnóstico radioscopía  
televisiva**

**Filmación**

**Tratamiento:**

**miotomía esfínter cricofaríngeo**

**Buen pronóstico**

# **Disfagia faríngea**

**Principalmente ADQUIRIDA**

**Afecta gerontes**

**Causada por neuropatías**

**miopatías, miastenia gravis**



# **Disfagia faríngea**

**La faringe no tiene la fuerza necesaria  
para impulsar el bolo**

# **Disfagia faríngea**

**Miotomía cricofaríngea contraindicada  
reflujo se alimento a faringe y aspiración**

**Pronóstico reservado**

**Megaesófago**

# **Esófago**

**Cervical**

**Torácica**

**Abdominal**

**EES Faringoesofágico**

**EEI Gastroesofágico**

**Mucosa**  
**Submucosa**  
**Muscular**  
**Adventicia**




**Estriado**



**Peristaltismo**


**Primario**

**Secundario**



**Deglución  
Faringe**

**E E I**



**Megaesófago**

**Congénito**

**Anillo  
Vascular  
Idiopático**

**Adulto**

**Idiopático  
Secundario**



## **Congénito**

### **Hereditario**

**Fox Terrier P.D.**

**Shnauzer Mini**

### **Mayor incidencia racial**

**G. Danés, O. Alemán**

**Setter, Shar pei**

**Labrador Retriver**

**Gato Siamés**


**Megaesófago  
Secundario (adquirido)**

**Neurológico: distemper, tétanos, talio,**

**Muscular: polimiositis  
hipoadrenocorticismo, LES**


**Obstructivo: c. extraños, tumores**

# Megaesófago idiopático



# **Signos Clínicos**

**Regurgitación**



**Neumonía por aspiración**

**Tos productiva  
Disnea  
S. febril**

**Apetito: aumentado, normal, disminuído.**

**Pérdida de peso, caquexia, ↓ crecimiento.**

**Inicio de signos en el destete.**

**Deshidratación.**

**O. Alemán**

**Hembra**

**4 meses**

**“vómitos alimenticios y líquidos”**

**6 a 7 veces por día**

**pérdida de peso**

**baja tasa de crecimiento.**

**Diagnóstico Diferencial**

**Etiologías de vómitos y**

**regurgitación**



Acceso directo a [DISFAGIA ALTA CACHORRO.Ink](#)





EMODEXIA 9 ME



Acceso directo a Mega pitbull .Ink

**Diagnóstico**

# **Diagnóstico**

**Signos clínicos**

**Radiología simple**

**Radiología de contraste**

**Radioscopía**

# Terapéutica

- **Terapia hidroelectrolítica**
- **Dieta hipercalórica elevada - consistencia variable**
- **Antibióticoterapia parenteral**
- **Cirugía ————— anillo vascular**

# Terapéutica

**Anticolinérgicos**



**Nifedipina**

**Procinéticos**



**Metoclopramida**

**Cisapride**

**Diagnóstico**

**Megaesófago  
secundario**

**Miastenia Gravis**

**Otras  
Enf. Neuromusculares**

**Enf. Addison**

**¿ Hipotiroidismo ?**

**Miastenia**

**Gravis**

**Focal**


**Megaesófago  
Solo**

**Megaesófago  
debilidad facial  
faríngea o laríngea**

**Generalizada**



# Músculo Estriado



Anticuerpos

**Miastenia gravis**

**+ > 0,6 nm/l**

**Detección de anticuerpos  
anti AC**

**Falsos  
negativos**

# Miastenia gravis

**Inmunosupresión**

**Corticoides**

**Azatioprina**

**Bromuro de  
Piridostigmina**

**0,5 - 1 Mg / Kg  
oral 8-12 hs.**

**Neostigmina**

**0,04 Mg/kg IM / 6hs**

# **Miastenia gravis**

**Evaluar anticuerpos c/4 a 6 semanas.**


**Continuar tratamiento hasta la normalización de los anticuerpos.**

**Remisión demora de 1 mes a 1 año.**

**Mejoría clínica en 50 % de los pacientes.**

**Megaesófago**

**Pronóstico reservado  
a grave**



NEOEsfago.Ink

# **Megaesófago**

**Caninos y felinos**

**Jóvenes - adultos**

**Retraso crecimiento**

**Cronicidad**

**Regurgitación**

**Apetito aumentado**

# **Megaesófago**

**Rx simple tórax**

**Rx contrastada**

**Etiología (cirugía)**

**Manejo terapéutico  
conservador**

**Pronóstico  
reservado**