

**Enteropatía con respuesta
a los antibióticos (ARD)**

**Enteropatía con respuesta
a los antibióticos**

Definición

**Enfermedad idiopática del intestino delgado
asociado a la presencia de bacterias
en el mismo con respuesta a antibióticoterapia
empírica.**

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Características

El nº de bacterias en ID no siempre es elevado

no es una verdadera hipermultiplicación bacteriana

pueden estar presentes bacterias aeróbicas, anaeróbicas

y anaeróbicas facultativas

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Diagnóstico

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Signos clínicos

Diarrea crónica o recurrente

Pérdida de peso

Flatulencias

Borborigmos

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Diagnóstico

No son de utilidad:

Medición de la relación Folato / B12

Cultivos totales de jugo duodenal

Coprocultivos

Medición de aumento de ácidos biliares no conjugados

(Bacterias desconjugan sales biliares)

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Diagnóstico

No hay una causa identificable de los signos presentes

Respuesta positiva a antibióticoterapia

Recidiva al suspender la terapéutica y mejora al

reiniciarla.

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Terapéutica

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Terapéutica

**Metronidazol
+
Enrofloxacina**

Amoxicilina

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Terapéutica

Tetraciclina efectiva

Administrarse sin alimento y con agua

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Terapéutica

Ensayo terapéutico durante 4 semanas

Respuesta + continuar 4 semanas

Dosis mínima efectiva

Adecuado usar dieta hipoalergénica conjunta

Enteropatía con respuesta

a los antibióticos

Terapéutica

Puede ser necesario largo tiempo de tratamiento

o aún de por vida

Pronóstico

Reservado